

## (胃癌)\_HER + SP療法

1クールの日数： 21 日間

注射	薬品名	投与量	用法	時間	投与日
Rp1	生食	250 mL	div	ルートキープ	
Rp2	生食 トラスツズマブ	250 mL 8 mg/kg	div	90分	
Rp3	生食	250 mL	div	1時間	
Rp4	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75 mg/50 mL 6.6 mg/2 mL	div	15分	
Rp5	生食 シスプラチニン	500 mL 60 mg/m <sup>2</sup>	div	2時間	day1
Rp6	生食	500 mL	div	2時間	
Rp7	ソルデム3A フロセミド	500 mL 10 mg/1mL	div	2時間	
Rp8	ソルデム3A	500 mL	div	3時間	
Rp1	生食 デキサメタゾン	50 mL 6.6 mg/2 mL	div	15分	day2.3
Rp2	ソルデム3A	500 mL	div	3時間	
Rp3	ソルデム3A	500 mL	div	3時間	
内服	薬品名	投与量	用法	用法	投与日
Rp1	S-1	80 mg/m <sup>2</sup>	po	1日2回朝夕食後	day1夕 -day15朝

### 【備考】

- ・トラスツズマブの投与量は、1クール目 8 mg/kg、2クール目以降 6 mg/kg
- ・トラスツズマブの投与時間は、1クール目90分、問題なければ2クール目は60分、問題なければ3クール目以降30分
- ・アプレピタント併用
- ・シスプラチニンは遮光必要

