

## (胃癌) \_Nivo+mFOLFOX6療法

1ケールの日数： 14 日間

注射	薬品名	投与量	投与方法	時間	投与日
Rp1	生食	250 mL	div	ルートキープ	day1
Rp2	生食 ニボルマブ	76 mL 240 mg/body	div	30分	day1
Rp3	生食	50 mL	div	30分	day1
Rp4	パロノセトロン デキサメタゾン ファモチジン クロルフェニラミン	0.75 mg/50 mL 6.6 mg/2 mL 20 mg/2 mL 5 mg/1 mL	div	15分	day1
Rp5	5%ブドウ糖液 オキサリプラチン	250 mL 85 mg/m <sup>2</sup>	div	120分	day1
Rp6	5%ブドウ糖液 レボホリナート	250 mL 200 mg/m <sup>2</sup>	div	120分	day1
Rp7	生食 フルオロウラシル	50 mL 400 mg/m <sup>2</sup>	div	急速投与	day1
Rp8	生食 フルオロウラシル	適量 2400 mg/m <sup>2</sup>	div	46時間	day1-3

### 【備考】

- ・ Nivo投与時は、インラインフィルターを使用する。
- ・ オキサリプラチン、レボホリナートは同時投与。
- ・ 持続投与のフルオロウラシルは、総量100 mLとなるよう生食の量を調整。  
　　シュアフューザーポンプを使用。