

(食道癌) _Nivo+FP療法

1ケールの日数： 28 日間

注射	薬品名	投与量	用法	時間	投与日
Rp1	ソルデム3A	500 mL	div	6時間	day0
Rp2	ソルデム3A	500 mL	div	6時間	
Rp1	ハルトマン輸液	500 mL	div	5時間	day1
Rp2	ハルトマン輸液	500 mL	div	5時間	
Rp3	ソルデム3A 硫酸Mg補正液	500 mL 20 mEq/20mL	div	90分	
Rp4	生食 ニボルマブ	76 mL 240 mg/body	div	30分	
Rp5	パロノセトロン ホスネツピタント デキサメタゾン	0.75 mg/50mL 235 mg/10mL 6.6 mg/2mL	div	30分	
Rp6	生食 シスプラチニ	500 mL 80 mg/m ²	div	2時間	
Rp7	生食	500 mL	div	2時間	
Rp8	エルネオパNF1号輸液 生食 フルオロウラシル	1000 mL 1000 mL 800 mg/m ²	div	24時間	
Rp9	ソルデム3A フロセミド	500 mL 10 mg/1mL	div	2時間	
Rp1	生食 デキサメタゾン	50 mL 6.6 mg/2mL	div	15分	
Rp2	ソルデム3A	500 mL	div	3時間	
Rp3	ソルデム3A	500 mL	div	3時間	day2
Rp4	エルネオパNF1号輸液 生食 フルオロウラシル	1000 mL 1000 mL 800 mg/m ²	div	24時間	
Rp1	生食 デキサメタゾン	50 mL 6.6 mg/2mL	div	15分	
Rp2	エルネオパNF1号輸液 生食 フルオロウラシル	1000 mL 1000 mL 800 mg/m ²	div	24時間	day3-5
Rp1	生食	250 mL	div	ルートキープ	
Rp2	生食 ニボルマブ	76 mL 240 mg/body	div	30分	day15

【備考】

- ・シスプラチニおよびエルネオパNF輸液は遮光必要
- ・ニボルマブ投与時はインラインフィルターを使用する。