

(大腸癌)_BEV+mFOLFOX6療法

1クールの日数： 14 日間

注射	薬品名	投与量	投与方法	時間	投与日
Rp1	生食	250 mL	div	ルートキープ	day1
Rp2	パロノセトロン	0.75 mg/50 mL	div	15分	day1
	デキサメタゾン	6.6 mg/2 mL			
	ファモチジン	20 mg/20 mL			
	クロルフェニラミン	5 mg/1 mL			
Rp3	生食	100 mL	div	90分	day1
ベバシズマブ	5 mg/kg				
Rp4	5%ブドウ糖液	250 mL	div	120分	day1
	オキサリプラチン	85 mg/m ²			
Rp5	5%ブドウ糖液	250 mL	div	120分	day1
	レボホリナート	200 mg/m ²			
Rp6	生食	50 mL	div	急速投与	day1
	フルオロウラシル	400 mg/m ²			
Rp7	生食	適量	div	46時間	day1-3
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²			

【備考】

- ・ベバシズマブの投与時間は、初回90分、問題なければ2回目60分、3回目以降30分まで短縮可。
- ・オキサリプラチン、レボホリナートは同時投与。
- ・持続投与のフルオロウラシルは、総量100 mLとなるよう生食の量を調整。
シュアフューザーポンプを使用。