

(大腸癌)_BEV+sLV5FU2療法

1クールの日数： 14 日間

| 注射 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 時間 | 投与日 |
|-----|----------|------------------------|------|--------|--------|
| Rp1 | 生食 | 250 mL | div | ルートキープ | day1 |
| Rp2 | 生食 | 50 mL | div | 15分 | day1 |
| | デキサメタゾン | 6.6 mg/2 mL | | | |
| Rp3 | 生食 | 100 mL | div | 90分 | day1 |
| | ペバシズマブ | 5 mg/kg | | | |
| Rp4 | 5%ブドウ糖液 | 250 mL | div | 120分 | day1 |
| | レボホリナート | 200 mg/m ² | | | |
| Rp5 | 生食 | 50 mL | div | 急速投与 | day1 |
| | フルオロウラシル | 400 mg/m ² | | | |
| Rp6 | 生食 | 適量 | div | 46時間 | day1-3 |
| | フルオロウラシル | 2400 mg/m ² | | | |

【備考】

- ・ペバシズマブの投与時間は、初回90分、問題なければ2回目60分、3回目以降30分まで短縮可。
- ・持続投与のフルオロウラシルは、総量100 mLとなるよう生食の量を調整。
シユアフューザーポンプを使用。