

(大腸癌)_mFOLFOXIRI療法

1クールの日数： 14 日間

1クール目～12クール目

注射	薬品名	投与量	投与方法	時間	投与日
Rp1	生食	250 mL	div	ルートキープ	day1
Rp2	生食 ホスアプレピタント	100 mL 150 mg	div	30分	day1
Rp3	パロノセトロン デキサメタゾン ファモチジン クロルフェニラミン	0.75 mg/50 mL 6.6 mg/2 mL 20 mg/20 mL 5 mg/1 mL	div	15分	day1
Rp4	5%ブドウ糖液 イリノテカン	250 mL 150 mg/m ²	div	60分	day1
Rp5	5%ブドウ糖液 オキサリプラチニ	250 mL 85 mg/m ²	div	120分	day1
Rp6	5%ブドウ糖液 レボホリナート	250 mL 200 mg/m ²	div	120分	day1
Rp7	生食 フルオロウラシル	適量 2400 mg/m ²	div	46時間	day1-3

13クール目以降

注射	薬品名	投与量	投与方法	時間	投与日
Rp1	生食	250 mL	div	ルートキープ	day1
Rp2	生食 デキサメタゾン グラニセトロン	50 mL 6.6 mg/2 mL 3 mg/3 mL	div	15分	day1
Rp3	5%ブドウ糖液 レボホリナート	250 mL 200 mg/m ²	div	120分	day1
Rp4	生食 フルオロウラシル	適量 2400 mg/m ²	div	46時間	day1-3

【備考】

- ・オキサリプラチニ、レボホリナートは同時投与。
- ・持続投与のフルオロウラシルは、総量100 mLとなるよう生食の量を調整。
シューアフューザーポンプを使用。