

## (大腸癌)\_RAM+FOLFI RI療法

1クールの日数： 14 日間

注射	薬品名	投与量	投与方法	時間	投与日
Rp1	生食	250 mL	div	ルートキープ	day1
Rp2	パロノセトロン デキサメタゾン クロルフェニラミン	0.75 mg/50 mL 6.6 mg/2 mL 5 mg/1 mL	div	15分	day1
Rp3	生食 ラムシルマブ	250 mL 8 mg/kg	div	120分	day1
Rp4	生食	100 mL	div	60分	day1
Rp5	5%ブドウ糖液 イリノテカン	250 mL 150 mg/m <sup>2</sup>	div	120分	day1
Rp6	5%ブドウ糖液 レボホリナート	250 mL 200 mg/m <sup>2</sup>	div	120分	day1
Rp7	生食 フルオロウラシル	50 mL 400 mg/m <sup>2</sup>	div	急速投与	day1
Rp8	生食 フルオロウラシル	適量 2400 mg/m <sup>2</sup>	div	46時間	day1-3

### 【備考】

- ・ラムシルマブは、フィルター付輸液ルートを使用。
- ・ラムシルマブの投与時間は、初回60分、問題なければ2回目以降30分まで短縮可。
- ・生食100 mLは、ラムシルマブと同一路由を使用。
- ・生食100 mLの投与時間は、初回・2回目以降は60分、問題なければ3回目以降は急速投与まで短縮可。
- ・イリノテカン、レボホリナートは同時投与。
- ・持続投与のフルオロウラシルは、総量100 mLとなるよう生食の量を調整。  
　　シュアフューザーポンプを使用。