

## (乳癌)\_HER + PER + wPTX療法(2回目以降)

1クールの日数： 21 日間

注射	薬品名	投与量	用法	時間	投与日
Rp1	生食	250 mL	div	ルートキープ	day1
Rp2	生食 トラスツズマブ	250 mL 6 mg/kg	div	60分	
Rp3	生食	50 mL	div	30分	
Rp4	生食 ペルツズマブ	250 mL 420 mg/body	div	30分	
Rp5	生食	100 mL	div	30分	
Rp6	生食	50 mL	div	15分	
	グラニセトロン	3 mg/3mL			
	デキサメタゾン クロルフェニラミン	6.6 mg/2mL 5 mg/1mL			
Rp7	ファモチジン	20 mg/20mL	iv	-	
Rp8	5%ブドウ糖液 パクリタキセル	250 mL 80 mg/m <sup>2</sup>	div	60分	
Rp1	生食	250 mL	div	ルートキープ	day8.15
Rp2	生食	50 mL	div	15分	
	グラニセトロン	3 mg/3mL			
	デキサメタゾン クロルフェニラミン	6.6 mg/2mL 5 mg/1mL			
Rp3	ファモチジン	20 mg/20mL	iv	-	
Rp4	5%ブドウ糖液 パクリタキセル	250 mL 80 mg/m <sup>2</sup>	div	60分	

### 【備考】

- ・パクリタキセルはフィルター付輸液ルートを使用
- ・計4クールを上限とする