

(胚細胞腫瘍)_BEP療法

1クールの日数： 21 日間

注射	薬品名	投与量	用法	時間	投与日
Rp1	生食 ファモチジン	1000 mL 20 mg/20mL	div	12時間	day0
Rp1	生食 ファモチジン	1000 mL 20 mg/20mL	div	12時間	
Rp2	生食 ファモチジン	1000 mL 20 mg/20mL	div	12時間	
Rp3	生食	250 mL	div	ルートキープ	
Rp4	生食 ブレオマイシン	40 mL 30 mg/body	div	全開	
Rp5	ハルトマン エトポシド	500 mL 100 mg/m ²	div	2時間	
Rp6	ソルデム3A 硫酸Mg	500 mL 20 mEq/20mL	div	90分	day1
Rp7	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75 mg/50mL 6.6 mg/2mL	div	15分	
Rp8	生食 シスプラチニン	500 mL 20 mg/m ²	div	2時間	
Rp9	生食 メトクロラミド	100 mL 10 mg/2mL	div	30分	
Rp10	フロセミド	20 mg/2mL	iv	-	
Rp1	生食 ファモチジン	1000 mL 20 mg/20mL	div	12時間	
Rp2	生食 ファモチジン	1000 mL 20 mg/20mL	div	12時間	
Rp3	生食	250 mL	div	ルートキープ	
Rp4	ハルトマン エトポシド	500 mL 100 mg/m ²	div	2時間	
Rp5	ソルデム3A 硫酸Mg	500 mL 20 mEq/20mL	div	90分	day2-5
Rp6	生食 デキサメタゾン	50 mL 6.6 mg/2mL	div	15分	
Rp7	生食 シスプラチニン	500 mL 20 mg/m ²	div	2時間	
Rp8	生食 メトクロラミド	100 mL 10 mg/2mL	div	30分	
Rp9	フロセミド	20 mg/2mL	iv	-	
Rp1	生食 ファモチジン	1000 mL 20 mg/20mL	div	12時間	day6
Rp2	生食 ファモチジン	1000 mL 20 mg/20mL	div	12時間	day6.7
Rp1	生食	250 mL	div	ルートキープ	
Rp2	生食 ブレオマイシン	40 mL 30 mg/body	div	全開	day8.15
【備考】					
・アプレビタント必要					
・生食 + ファモチジンはメインルート、ルートキープの生食はサブルート					
・ブレオマイシン、エトポシドはサブルートの側管より投与、エトポシドはフィルター付輸液ルートを使用					