

(膀胱癌)_GC療法

1クールの日数： 28 日間

注射	薬品名	投与量	用法	時間	投与日
Rp1	生食	1000 mL			day1
	ファモチジン	20 mg/20mL	div	24時間	
	炭酸水素Na	33.3 mEq/40mL			
Rp2	パロノセトロン	0.75 mg/50mL	div	15分	day1
	デキサメタゾン	6.6 mg/2mL			
Rp3	生食	100 mL	div	30分	day2
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²			
Rp1	生食	1000 mL			day2
	ファモチジン	20 mg/20mL	div	24時間	
	炭酸水素Na	33.3 mEq/40mL			
Rp1	ソルデム3A	500 mL	div	90分	day2
	硫酸Mg	20 mEq/20mL			
Rp2	生食	50 mL	div	15分	day2
	デキサメタゾン	6.6 mg/2mL			
Rp3	生食	500 mL	div	120分	day3.4
	シスプラチニン	70 mg/m ²			
Rp4	ハルトマン	500 mL	div	120分	day3.4
	フロセミド	20 mg/2mL			
Rp1	生食	1000 mL			day8.15
	ファモチジン	20 mg/20mL	div	24時間	
	炭酸水素Na	33.3 mEq/40mL			
Rp1	生食	250 mL	div	ルートキープ	
Rp2	生食	50 mL			day8.15
	グラニセトロン	3 mg/3mL	div	15分	
	デキサメタゾン	6.6 mg/2mL			
Rp3	生食	100 mL	div	30分	
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²			

【備考】

- ・アプレピタント併用
- ・ゲムシタビンはday1のみ側管から投与