

(膀胱癌)_MEC療法

1クールの日数： 28 日間

注射	薬品名	投与量	用法	時間	投与日
Rp1	生食 ファモチジン 炭酸水素Na	1000 mL 20 mg/20mL 33.6 mEq/40mL	div	12時間	day0.1
Rp1	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75 mg/50mL 6.6 mg/2mL	div	15分	
Rp2	生食 メトトレキサート	40 mL 30 mg/m ²	iv	-	
Rp3	ホリナートカルシウム	3 mg	im	-	day1
Rp4	生食 エビルビシン	100 mL 50 mg/m ²	div	60分	
Rp5	ハルトマン	500 mL	div	3時間	
Rp6	ホリナートカルシウム	3 mg	im	-	
Rp7	ホリナートカルシウム	3 mg	im	-	
Rp8	生食 ファモチジン 炭酸水素Na	1000 mL 20 mg/20mL 33.6 mEq/40mL	div	12時間	
Rp1	生食 ファモチジン 炭酸水素Na	1000 mL 20 mg/20mL 33.6 mEq/40mL	div	12時間	
Rp2	ソルデム3A 硫酸Mg	500 mL 20 mEq/20mL	div	90分	day2
Rp3	ホリナートカルシウム	3 mg	im	-	
Rp4	生食 デキサメタゾン	50 mL 6.6 mg/2mL	div	15分	
Rp5	生食 シスプラチン	20 mL 100 mg/m ²	div	2時間	
Rp6	フロセミド	20 mg/2mL	iv	-	
Rp7	ハルトマン	500 mL	div	2時間	
Rp8	生食 ファモチジン 炭酸水素Na	1000 mL 20 mg/20mL 33.6 mEq/40mL	div	12時間	
Rp1	生食 ファモチジン 炭酸水素Na	1000 mL 20 mg/20mL 33.6 mEq/40mL	div	12時間	day3
Rp2	生食 ファモチジン 炭酸水素Na	1000 mL 20 mg/20mL 33.6 mEq/40mL	div	12時間	
Rp1	生食 メトトレキサート	40 mL 30 mg/m ²	iv	-	
Rp2	ホリナートカルシウム	3 mg	im	-	day15
Rp3	ホリナートカルシウム	3 mg	im	-	
Rp4	ホリナートカルシウム	3 mg	im	-	
Rp5	ホリナートカルシウム	3 mg	im	-	day16

【備考】

- ・シスプラチンの上限調製量は700mL、遮光下で投与
- ・メトトレキサートは緩徐に投与
- ・ホリナートカルシウムは6時間間隔で投与
- ・アプレピタント必要