

(乳癌) _HER+PER+wPTX療法(初回)

1クールの日数： 21 日間

注射	薬品名	投与量	用法	時間	投与日
Rp1	ハルトマン	500 mL	div	5時間	day1
Rp2	生食 トラスツズマブ	250 mL 8 mg/kg	div	90分	
Rp1	生食	250 mL	div	ルートキープ	day2
Rp2	生食 ペルツズマブ	250 mL 840 mg/body	div	60分	
Rp3	生食	100 mL	div	60分	
	生食	50 mL			
	グラニセトロン	3 mg/3 mL			
Rp4	デキサメタゾン	6.6 mg/2 mL	div	15分	
	ファモチジン	20 mg/2 mL			
	クロルフェニラミン	5 mg/1 mL			
Rp5	5%ブドウ糖液 パクリタキセル	250 mL 80 mg/m ²	div	60分	
Rp1	生食	250 mL	div	ルートキープ	
	生食	50 mL			
	グラニセトロン	3 mg/3 mL			
Rp2	デキサメタゾン	6.6 mg/2 mL	div	15分	day8. 15
	ファモチジン	20 mg/2 mL			
	クロルフェニラミン	5 mg/1 mL			
Rp3	5%ブドウ糖液 パクリタキセル	250 mL 80 mg/m ²	div	60分	

【備考】

- ・パクリタキセルはフィルター付輸液ルートを使用
- ・計4クールを上限とする

(乳癌) _HER+PER+wPTX療法(2回目以降)

1クールの日数： 21 日間

注射	薬品名	投与量	用法	時間	投与日
Rp1	生食	250 mL	div	ルートキープ	day1
Rp2	生食 トラスツズマブ	250 mL 6 mg/kg	div	90分	
Rp3	生食	50 mL	div	30分	day8. 15
Rp4	生食 ペルツズマブ	250 mL 420 mg/body	div	60分	
Rp5	生食	100 mL	div	30分	
	生食	50 mL			
	グラニセトロン	3 mg/3mL			
Rp6	デキサメタゾン	6.6 mg/2mL	div	15分	
	ファモチジン	20 mg/2mL			
	クロルフェニラミン	5 mg/1mL			
Rp7	5%ブドウ糖液 パクリタキセル	250 mL 80 mg/m ²	div	60分	
Rp1	生食	250 mL	div	ルートキープ	
	生食	50 mL			
	グラニセトロン	3 mg/3mL			
Rp2	デキサメタゾン	6.6 mg/2mL	div	15分	day8. 15
	ファモチジン	20 mg/2mL			
	クロルフェニラミン	5 mg/1mL			
Rp3	5%ブドウ糖液 パクリタキセル	250 mL 80 mg/m ²	div	60分	

【備考】

- ・パクリタキセルはフィルター付輸液ルートを使用
- ・計4クールを上限とする
- ・トラスツズマブの投与時間は、問題なければ30分まで短縮可
- ・ペルツズマブの投与時間は、問題なければ30分まで短縮可