

## (乳癌)\_HER+PTX療法(毎週)(初回)

1クールの日数： 7 日間

注射	薬品名	投与量	用法	時間	投与日
Rp1	ハルトマン	500 mL	div	5時間	day1
Rp2	生食 トラスツズマブ	250 mL 4 mg/kg	div	90分	
Rp1	生食	250 mL	div	ルートキープ	
Rp2	生食 グラニセトロン デキサメタゾン ファモチジン クロルフェニラミン	50 mL 3 mg/3mL 6.6 mg/2mL 20 mg/2mL 5 mg/1mL	div	15分	day2
Rp3	5%ブドウ糖液 パクリタキセル	250 mL 80 mg/m <sup>2</sup>	div	60分	

### 【備考】

- ・パクリタキセルはフィルター付輸液ルートを使用
- ・術後補助化学療法 上限12クールまで

## (乳癌)\_HER+PTX療法(毎週)(初回)(特殊：一括施行)

1クールの日数： 7 日間

注射	薬品名	投与量	用法	時間	投与日
Rp1	生食	50 mL	div	ルートキープ	day1
Rp2	生食 トラスツズマブ	250 mL 4 mg/kg	div	90分	
Rp3	生食	100 mL	div	3時間	
Rp4	生食 グラニセトロン デキサメタゾン ファモチジン クロルフェニラミン	50 mL 3 mg/3mL 6.6 mg/2mL 20 mg/2mL 5 mg/1mL	div	15分	
Rp5	5%ブドウ糖液 パクリタキセル	100 mL 80 mg/m <sup>2</sup>	div	60分	
Rp6	生食	100 mL	div	3時間	

### 【備考】

- ・パクリタキセルはフィルター付輸液ルートを使用
- ・術後補助化学療法、上限12クールまで

## (乳癌)\_HER+PTX療法(毎週)(2回目以降)

1クールの日数： 21 日間

注射	薬品名	投与量	用法	時間	投与日
Rp1	生食	250 mL	div	ルートキープ	
Rp2	生食 トラスツズマブ	250 mL 2 mg/kg	div	90分	

Rp3	生食	50 mL	div	30分	day1
Rp4	生食	50 mL	div	15分	
	グラニセトロン	3 mg/3mL			
	デキサメタゾン	6.6 mg/2mL			
	ファモチジン	20 mg/2mL			
	クロルフェニラミン	5 mg/1mL			
Rp5	5%ブドウ糖液	250 mL	div	60分	
	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>			

【備考】					
・トラスツズマブの投与時間は、初回は90分、問題なければ2回目以降30分まで短縮可 ・パクリタキセルはフィルター付輸液ルートを使用					