

(乳癌) _ フエスゴ+wPTX療法(初回)

1クールの日数： 21 日間

注射	薬品名	投与量	用法	時間	投与日
Rp1	生食	250 mL	div	ルートキープ	
Rp2	フェスゴ [IN]	1V	sc	8分	
Rp3	生食	50mL	div	30分	
	生食	50 mL			
Rp4	グラニセトロン	3 mg/3mL			
	デキサメタゾン	6.6 mg/2mL	div	15分	day1
	ファモチジン	20 mg/2mL			
	クロルフェニラミン	5 mg/1mL			
Rp5	5%ブドウ糖液	250mL	div	60分	
	パクリタキセル	80 mg/m ²			
Rp1	生食	250mL	div	ルートキープ	
	生食	50 mL			
Rp2	グラニセトロン	3 mg/3mL			
	デキサメタゾン	6.6 mg/2mL	div	15分	day8, 15
	ファモチジン	20 mg/2mL			
	クロルフェニラミン	5 mg/1mL			
Rp3	5%ブドウ糖液	250mL	div	60分	
	パクリタキセル	80 mg/m ²			

【備考】

- ・パクリタキセルはフィルター付輸液ルートを使用
- ・投与後は30分観察時間をもうけること

(乳癌) _ フエスゴ+wPTX療法(2回目以降)

1クールの日数： 21 日間

注射	薬品名	投与量	用法	時間	投与日
Rp1	生食	250 mL	div	ルートキープ	
Rp2	フェスゴ [MA]	1V	sc	5分	
Rp3	生食	50mL	div	15分	
	生食	50 mL			
Rp4	グラニセトロン	3 mg/3mL			
	デキサメタゾン	6.6 mg/2mL	div	15分	day1
	ファモチジン	20 mg/2mL			
	クロルフェニラミン	5 mg/1mL			
Rp5	5%ブドウ糖液	250mL	div	60分	
	パクリタキセル	80 mg/m ²			
Rp1	生食	250mL	div	ルートキープ	
	生食	50 mL			
Rp2	グラニセトロン	3 mg/3mL			
	デキサメタゾン	6.6 mg/2mL	div	15分	day8, 15
	ファモチジン	20 mg/2mL			
	クロルフェニラミン	5 mg/1mL			
Rp3	5%ブドウ糖液	250mL	div	60分	
	パクリタキセル	80 mg/m ²			

【備考】

- ・パクリタキセルはフィルター付輸液ルートを使用
- ・フェスゴ投与後は15分観察時間をもうけること